

Perdin blanc

Vass7R13s336-340




Collection Vassal-Montpellier

6589Mtp1


*Perdin blanc
7R13s.336+340*

Perdin bl

7 R 13 s 336.340







ANNEE 1991

NOM Perduin bl
2947

EMPLACEMENT 7 Rg 13 1 336- 340

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	15.3	21.3.	2	3	3.6	7.6	11.6	26.7	29.7	1.8	40.8
2	6	15.3	21.3.	0			+7			+4		+1
3	6	15.3	21.3.	4								
4	A.C											
5	A.C											

Grappe : G - M - P Dim : 16 Compacité : L - M - C
 Pour : 0 Mill : 0
 Baie : TG - G - M - P Dim : 16
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : 1/2 enge Vigueur : 3

ANNEE 1992

NOM 2947.01 Perduin

EMPLACEMENT

7 R 13 1 336-340
10 R 6 1 351. 355

INRA Bx

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	16.3	19.3.	5	20	18.5	21.5	26.5	9.7	12.7	17.7	28.7 17.8
2	2	16.3	19.3.	1			-1			-2		+1
3	4	16.3	19.3.	8								
4	f											
5	2	19.3	23.3	6								

Grappe : G - M - P Dim : 15a 20 Compacité : L - M - C
 Pour : 0 Mill : 2
 Baie : TG - G - M - P Dim : 18
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : mi enge Vigueur : 3,5

ANNEE 1992

INRA 6x

NOM

Perdier el
294701

EMPLACEMENT

7 R 13 s 336.340

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	13.3	19.3	14	33	18.5	21.5	26.5	16.7 9.7	16.7	21.7	8.8 8.8
2	4	19.3	23.3	13			-1			-1		-1
3	4	16.3	23.3	16								
4	1											
5	1											

Grappe : G - M - P Dim : 14 à 19 Compacité: L - M - C
 Pour : 0 Mill : 0,5
 Baie : TG - G - M - P Dim : 19x19
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : 1/2 arge Vigueur : 3,5

De 23.3.92
 +3

ANNEE 1993

14e

NOM

Perdier blanc

EMPLACEMENT

7 R 13 s. 336.340

10 R 6 A 351 - 355

294701

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	8.3	11.3	5	10	24.5	28.5	3.6	12.7	15.7	19.7	16.8
2	6	11.3	16.3	8			-2			-1		+1
3	4	11.3	16.3	0								
4	6	11.3	16.3	10								
5	6	11.3	16.3	5								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : 0 Mill : 0
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur : 3,5

De 16.3.93
 -4

ANNEE : 1995
NOM Perdin

EMPLACEMENT 10 R6 1 351.355

2947.01

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	6.3	13.3	8	14	26.5	30.5	2.6	17.7	20.7	24.7	16.8
2	4	13.3	16.3	7		+2				+1		0
3	4	16.3	20.3	6								
4	4	23.2	27.2	1		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : 4 <i>conclusion 1/2</i>						
5	4	6.3	13.3	7								
	20			29								
	16	13.3	25 (-4)									

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Perdix blanc

7 R 13 A-336-340 A⁴

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 89

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Perdiz bl.

7R13 s. 336-340 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Perdin blanc

7 R 130-336-340 s.1

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 90

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Perdin blanc

7 R 13 A. 336-340-0.4

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne *69* - Petite 70 (dimensions *14* x).
Lâche 71 - Moyenne *72* - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long *76*.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification *79*.
Axe de la rafle coloré *80* - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne *84* - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière *assez* - irrégulière (dimensions *18* x *18*).
De couleur blanc *87* - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée *92* - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde *96* - ellipsoïde *97* - ovoïde 98 -
truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore *105* - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière *107* - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée *111*.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée *114* - aromatique 115 - foxée 116 -
herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen *120* - court 121.
A pédicelle de couleur : verte *122* - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte *125* - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent *129*.
A pinceau : court 130 - moyen *131* - long *132*.
A pinceau : coloré 133 - non coloré *134*.
A peau fine *135* - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse *139* - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 90

Perdix blanc

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

7 R 130-336-340 + 2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 13 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

N° d'ordre : 2947.01
Désignation : *Perdu bl*
Emplacement : 7 R13 s 336.340

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - ㉔
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉖ - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉟ - 38 - ㉟③
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉖⑨ - autre : ㉗①
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ㉠ - 41
Dents (angle) : 42 - ㉡ - ㉢
Angle du lobe terminal : 45 - ㉣ - ㉤
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉥ - ㉦
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ㉧ - ㉨ - ㉩ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reunes 92